

BIONECT®

Plus Krém

Opis produktu

Krém BIONECT PLUS je prípravok, na lokálne použitie, ktorého hlavnou zložkou je sodná sol' kyseliny hyalurónovej. Kyselina hyalurónová je biologický polysacharid (glykozaminoglykán) distribuovaný v extracelulárnej matrice väčšiny tkanív. Niekol'ko štúdií zdokumentovalo, že sa môže podieľať na procesoch obnovenia mnohých rozmanitých tkanív, ktoré podporujú hojenie a opäťovnú epitelizáciu. Vďaka svojim hydrofilným vlastnostiam poskytuje vlhké prostredie v ranach potrebné pre prírodený proces hojenia. Sulfadiazín strieborný je známe antimikrobiálne činidlo, ktoré inhibuje rast takmer všetkých patogénnych baktérií a húb in vitro. Prítomnosť sulfadiazínu strieborného v zložení produktu má významnú úlohu pri prevencii mikrobiálnej kontaminácie, a tým zlepšuje schopnosť kyseliny hyalurónovej podporovať hojenie rán. Tieto vlastnosti umožňujú meniť obváz dokonca iba raz denne, čo predstavuje pre pacienta minimálne nepohodlie a minimálne vystavenie lziež vzduchu, čím sa znižuje možnosť kontaminácie rany.

Zloženie

Hlavná zložka: sodná sol' kyseliny hyalurónovej 0,2 %
Ďalšie zložky: sulfadiazín strieborný 1 %, polyetylénglykol 400 monostearát, decylester kyseliny olejovej, emulgačný vosk, glycerol, roztok sorbitolu 70 %, čistena voda.

Indikácie

BIONECT PLUS je indikovaný na ošetroenie kožných lzieží, najmä lézií s vysokým rizikom infekcie. Je určený najmä na ošetroenie akútnych a chronických rán (popáleniny prvého a druhého stupňa, vredy vaskulárneho a metabolického pôvodu a otlaky) a na zabezpečenie vlhkého prostredia rán bez mikrúbor.

BIONECT PLUS sa môže použiť na neinfikované rany na prevenciu infekcie a po úspešnej liečbe infikovaných rán na prevenciu opakovaného výskytu infekcie.

Dávkovanie a spôsob podania

Lézie by sa mali pred každou aplikáciou očistiť. Naneste raz alebo dvakrát denne tenkú vrstvu krému na povrch rany v závislosti od závažnosti, kým nedôjde k úplnému uzdraveniu. Dlhodobú liečbu trvajúcu dlhšie ako mesiac by mal lekár posúdiť na základe klinického vývoja lzieží. Ošetrená oblasť by mala byť zakrytá sterilným obvázom.

Kontraindikácie

Nepodávajte pacientom so zistenou individuálnou precitlivenosťou na zložky produktu alebo so zlyhaním pečene alebo obličiek alebo s nedostatkom glukózo-6-fosfát dehydrogenázy.

Nepodávajte tehotným ženám a deťom.

Upozornenia a opatrenia

Nepoužívajte, ak je obal poškodený.

Nepoužívajte produkt po dátume exspirácie uvedenom na obale.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na výrobok uchovávaný v pôvodnom obale pri teplote pod 30°C.

Zlikvidujte do 12 mesiacov od prvého otvorenia.

Po použíti zlikvidujte podľa platnej vnútroštátnej praxe.
Uchovávajte mimo dosahu detí.

Vyvarujte sa priameho kontaktu tuby s ranou.

Každú tubu krému BIONECT PLUS by mal používať iba jeden pacient, aby sa znížilo riziko krízovej infekcie.

Vyvarujte sa vystaveniu ošetrovaných oblastí slnečnému žiareniu, pretože produkty obsahujúce sulfadiazín strieborný môžu zafarbiť pokožku do hnedosiva. Akékolvek škvry však možno ľahko odstrániť umytiom miesta, kde sa nachádzajú.

Interakcie

Nepoužívajte zároveň s dezinfekčnými prostriedkami obsahujúcimi kvartérne amóniové soli alebo lokálne aplikované proteolytické enzymy, pretože môžu reagovať s produkтом.

Nežiaduce účinky

BIONECT PLUS sa zvyčajne dobre znáša. Pri liečbe rozsiahlych časti tela sa môžu vyskytnúť vedľajšie účinky, ktoré sa niekedy pozorujú po systémovom podaní sulfonamidov, ako je zlyhanie obličiek, toxicák hepatitída, agranulocytóza, trombocytopénia, leukopénia.

Skladovanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C
Nezmrazujte.

Spôsob dodania

Kartónová škatuľka obsahujúca jednu 25 g tubu
Kartónová škatuľka obsahujúca jednu 100 g tubu

Výrobca

FIDIA Farmaceutici S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica 3/A
35031 Abano Terme (Padova) Taliansko

Dátum poslednej revízie návodu na použitie: marec 2016

